

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ



Nesecret

Anexa la nr. 533/2014

Cum să fii cu un pas înaintea Pestei Porcine Africane

- Pesta Porcină Africană este o boală virală
- În mod obișnuit este mortală pentru porcii domestici și mistreți
- Nu există vaccin sau tratament pentru această boală
- Din această cauză provoacă serioase probleme socio-economice în țările afectate
- Virusul rezistă câteva luni în mediul înconjurător și în cadavre
- Prepararea sau afumarea cărnii de porc NU distruge virusul
- Oamenii nu se îmbolnăvesc dar ajută la răspândirea virusului prin hainele sau echipamentele contaminate
- Semnele clinice ale bolii sunt variabile și nu sunt ușor de recunoscut
- Animalele afectate pot avea unul sau mai multe semne clinice, după cum urmează:
 - Febră mare, apatie și imposibilitate de a sta în picioare
 - Vomă, diaree, uneori cu sânge
 - Pete roșii-albăstrui pe piele, în special în zonele urechilor și râtului
 - Tuse și respirație îngreunată
 - Avorturi spontane, nașteri de feteși morți și nesiguranță în mers a purceilor
 - Majoritatea animalelor infectate mor în 10 zile
- Contaminarea animalelor sănătoase se poate produce în multe feluri:
 - Prin contactul direct al porcilor sănătoși cu cei bolnavi
 - Prin hrănirea acestora cu resturi alimentare contaminate
 - Contactul cu materiale contaminate
 - Contactul cu oamenii care poartă haine și încălțăminte contaminate
- Contactați imediat medicul veterinar dacă suspectați că efectivul de animale este contaminat
- Nu deplasați animalele din fermă sau gospodărie
- Întotdeauna schimbați-vă îmbrăcămintea și încălțăminte atunci când părăsiți ferma sau gospodăria
- Înainte de a achiziționa furaje, așternut și porci, asigurați-vă că acestea provin din unități verificate, care au implementate toate măsurile de siguranță pentru a evita pătrunderea virusului
- Asigurați-vă că porcii din gospodăria dumneavoastră nu intră în contact cu mistreții sau cu porcii din alte gospodării
- Niciodată să nu hrăniți porcii cu resturi alimentare
- Evitați creșterea porcilor în padocurile exterioare, în zonele în care evoluează Pesta Porcină Africană
- Achiziția și transportul cărnii și a preparatelor din carne de porc din zonele infectate pot răspândi virusul
- Vânătorii și câinii acestora nu trebuie să vină în contact cu porcii domestici după vânătoare
- Fermierii sau vânătorii să nu arunce pe câmp sau în pădure resturi rezultate în urma eviscerării carcaselor de porci domestici sau mistreți
- Nu aruncați resturi alimentare sau gunoi în zonele care pot fi frecventate de mistreți
- Contactați medicul veterinar dacă găsiți cadavre de mistreți chiar dacă în zonă NU evoluează PESTA PORCINĂ AFRICANĂ